

**ფურცელი-ჩანართი: ინფორმაცია პაციენტისთვის  
პრედუქტალი® OD 80მგ  
პროლონგირებული გამოთავისუფლების მყარი კაფსულები  
ტრიმეტაზიდინის ჰიდროქლორიდი**

სანამ დაიწყებდეთ პრეპარატის მიღებას ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ფურცელი-ჩანართი ბოლომდე, რადგანაც ის შეიცავს ოქსენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას

- შეინახეთ ეს ფურცელი-ჩანართი. შეიძლება ის კიდევ დაგჭირდეთ.
- თუ ოქსენ გაგიჩნდათ დამატებითი კითხვები, მიმიართეთ თქვენს მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.
- ეს პრეპარატი გამოწრილია პირადად ოქსენთვის, არ შეიძლება მისი გადაცემა სხვა პირებისთვის. ამან შეიძლება ზიანი მიაქციოს მათ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მათი სიმპტომები თქვენის მსგავსია.
- თუ ოქსენ გამოგიყლინდებათ რაიმე გვერდითი ეფექტები, დაუგავშირდით მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს. ეს ასევე ეხება ყველა იმ გვერდით ეფექტს, რომელიც ჩამოთვლილი არ არის ამ ფურცელ-ჩანართში (იხ. განყოფილება 4).

ამ ფურცელ-ჩანართში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა არის პრედუქტალი® OD 80მგ და რა შემთხვევებში გამოიყენება
2. რა უნდა ვიცოდეთ პრედუქტალი® OD 80მგ მიღების დაწყებამდე
3. როგორ მიიღება პრედუქტალი® OD 80მგ
4. შესაძლო გვერდითი მოქმედება
5. როგორ ინახება პრედუქტალი® OD 80მგ
6. შეფუთვის შემადგენლობა და სხვა ინფორმაცია

**1. რა არის პრედუქტალი® OD 80მგ და რა შემთხვევებში გამოიყენება**

სხვა კარდიოლოგიური ანტიარგინური საშუალებები – ათქ კოდი – C01EB15 ეს სამკურნალო პრეპარატი განკუთვნილია მოზრდილებში სტენოკარდიის სამკურნალოდ (ტკივილი მკერდის არეში, გამოწვეული გულის იშემიური დაავადებით) სხვა პრეპარატებთან კომბინაციაში.

**2. რა უნდა ვიცოდეთ პრედუქტალი® OD 80მგ მიღების დაწყებამდე**

**რა შემთხვევაში არ შეიძლება პრედუქტალი® OD 80მგ მიღება**

- თუ ოქსენ გაგაჩნიათ ალერგია ტრიმეტაზიდინზე ან ამ პრეპარატის სხვა კომპონენტზე (კომპონენტები ჩამოთვლილია მე-6 განყოფილებაში).
- თუ ოქსენ გაგაჩნიათ პარგინსონის დაავადება: თავის ტენიის დაზიანება, რომელიც იწვევს მოძრაობით დარღვევებს (ტრემორი, რიგიდობა, შენელებული მოძრაობა, რწევით სიარულის სტილი).
- თუ ოქსენ გაქვთ თირკმლის ფუნქციის მძიმე დაზიანება.

**გაფრთხილება და უსაფრთხოების ზომები**

გაიარეთ კონსულტაცია ოქსენს მკურნალ ექიმთან ან ფარმაცევტთან სანამ დაიწყებდეთ პრედუქტალი® OD 80მგ მიღებას.

ეს პრეპარატი არ არის განკუთვნილი სტენოკარდიის შეტევების კუპირებისთვის და არ არის ნაჩვენები არასტაბილური სტენოკარდიის საწყისი თერაპიისთვის. ის ასევე არ არის განკუთვნილი მიოკარდიუმის ინფარქტის სამკურნალოდ.

სტენოკარდიული შეტევის განვითარების შემთხვევაში, აცნობეთ თქვენს მკურნალ ექიმს. შეიძლება საჭირო გახდეს გამოკვლევა და თერაპიის შეცვლა.

ამ პრეპარატს შეუძლია გამოიწვიოს ან გააძლიეროს ისეთი სიმპტომები როგორიც არის ტრემორი, რიგიდობა, შენელებული მოძრაობები და რწევით სიარულის სტილი, განსაკუთრებით ხანდაზმულ პაციენტებში. საჭიროა ამ სიმპტომებზე ყურადღების მიქვევა; მათ შესახებ უნდა ეცნობოს მკურნალ ექიმს, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს დანიშნული თერაპია.

წნევის შემცირების შედეგად, წონასწორობის კარგვის გამო შესაძლებელია დავარდნა (იხ. გვერდითი ეფექტების აღწერა).

**სპორტსმენები:**

ეს სამკურნალო პრეპარატი შეიცავს აქტიურ ნივთიერებას, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს დადებითი რეაქცია ანალიზებში, რომელიც ტარდება ანტიდოპინგური კონტროლის მიზნით.

### ბაგშეგები და მოზარდები

პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ რეკომენდებული არ არის 18 წლამდე ასკის ბაგშეგებისთვის მისაღებად.

### სხვა პრეპარატები და პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ

წამლისმიერი ურთიერთქმედება გამოვლენილი არ არის.

თუ თქვენ დებულობთ, ადრე დგბულობდით ან აპირებთ სხვა პრეპარატების მიღებას, აცნობეთ ამის შესახებ თქვენს მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.

### პრედუქტალი პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ საკვებთან და სასმელებთან ერთად

პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ გამოყენება შესაძლებელია საკვებთან და სასმელებთან ერთად.

### ორსულობა და ლაქტაცია

ორსულობის დროს პრეპარატის მიღება რეკომენდებული არ არის. თუ ამ პრეპარატით თერაპიის დროს აღმოაჩენთ, რომ ხართ ორსულად, გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს მკურნალ ექიმთან, რადგანაც მხოლოდ მას შეუძლია იმსჯელოს თერაპიის გაგრძელების აუცილებლობაზე.

ლაქტაციში პრეპარატის გადასვლის შესახებ მონაცემების არ არსებობის გამო პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ გამოყენება არ შეიძლება.

თუ თქვენ ხართ ორსულად ან კვებავთ ბაგშეს, ფიქრობთ, რომ შეიძლება ორსულად ხართ ან გეგმავთ ორსულობას, პრეპარატის მიღებასთან დაკავშირებით, გაიარეთ კონსულტაცია თქვენ მკურნალ ექიმთან ან ფარმაცევტთან.

### ავტოტრანსპორტის და მექანიზმების მართვა

ამ პრეპარატის შეუძლია გამოიწვიოს თავტრუსხევევა და ძილიანობა, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენს მიერ ავტოტრანსპორტის და მექანიზმების მართვაზე.

### პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ შეიცავს საქართველოს

თუ თქვენ ექიმმა გითხრათმ, რომ გაგაჩნიათ ზოგიერთი შაქრის აუზანლობა, ამ პრეპარატის მიღებამდე გაიარეთ მასთან კონსულტაცია.

### 3. როგორ მიიღება პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ

ამ პრეპარატის მიღებისას ყოველთვის მკაცრად დაიცავით ექიმის მითითებები. თუ თქვენ ეჭვი გეპარტათ პრეპარატის მიღების სისწორეში, თქვენ რჩევა უნდა პკითხოთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ რეკომენდებული დოზა - 1 კაფსულა დღეში ერთხელ, საუზმის დროს.

თუ თქვენ დარღველი გაქვთ თირკმელების მუშაობა ან ხართ 75 წელზე უფროსი ასაკის, თქვენმა მკურნალმა ექიმმა შეიძლება შეცვლოს რეკომენდებული დოზა.

პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ განკუთვნილია პერიოდური მიღებისთვის. კაფსულები უნდა გადაიყლაპოს გაუხსნელად, წყლის დაყოლებით, საუზმის დროს.

### თუ თქვენ მიიღეთ უფრო მეტი პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ გიღრე რეკომენდებულია:

თუ თქვენ მიიღეთ უფრო მეტი კაფსულები ვიდრე დანიშნული გაქვთ, დაუყოფნებლივ მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

### თუ თქვენ დაგავიწყდათ პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ მიღება

თუ თქვენ დაგავიწყდათ პრეპარატის მიღება, უბრალოდ მიიღეთ შემდეგი დოზა ჩვეულ დროს. არ გააორმაგოთ მომდევნო დოზა.

### თუ თქვენ უნდა შეწყვიტოთ პრედუქტალი<sup>®</sup> OD 80მგ მიღება

თქვენი ექიმი შეგატყობინებთ თერაპიის ხანგრძლივობას. ამ პრეპარატის მიღების შეწყვეტამდე თქვენ კონსულტაცია უნდა გაიაროთ ექიმთან.

თუ თქვენ გაგიჩნდათ დამატებითი შეკითხები, მიმართეთ თქვენს მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.

### 4. შესაძლო გვერდითი მოქმედება

როგორც ნებისმიერმა სამკურნალო საშუალებამ, ასევე ამ პრეპარატმაც შეიძლება გამოიწვიოს გვერდითი ეფექტები, თუმცა არა ყველა პაციენტში.

გაგრცელებული (აზიანებს 10-დან 1-მდე პაციენტს):

თავბრუსხევა, თავის ტკიფილი, ტკიფილი მუცელის არეში, დიარეა, საჭმლის მონელების დაღვევა, გულისრევა, დებინება, გამონაყარი, ქავილი, ჭინჭრის ციება და სისუსტის შეგრძნება.

იშვიათი (უკითარდება 1000-დან 1-მდე პაციენტს):

სწრაფი ან არარეგულარული გულისცემა (გახშირებული გულისცემა), ექსტრასისტოლია, გახშირებული გულისცემა, არტერიული წნევის ვარდნა ადგომისას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თავბრუსხევა ან გულის წასვლა, შეუძლოდ ყოფნა (თვითშეგრძნების ზოგადი გაუარესება), დაცემა, ჰიპერემია.

#### სისშირე უცნობია

- ექსტრაპირამედული სიმპტომები (ანორმალური მოძრაობები, ხელების და თითების კანკალის და რხევის ჩათვლით, სხეულის ვერტიკალური დერმის გარშემო ტრიალი, რწევით სიარულის სტილი და ხელების და ფეხების რიგიდობა) როგორც წესი შექცევადია მკურნალობის შეწყვეტის შემდეგ.
- ძილის დარღვევება (დაძინების გამნელება, ძილიანობა), ყბზობა, კანზე გენერალიზებული წითელი გამონაყრის მძიმე ფორმა, ბუშტუკების წარმოქმნით, სახის, ტუჩების, პირის დრუს, ენის ან ყალის შეშუბება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ყლაპვის ან სუნთქვის გამნელება.
- ტრიალის შეგრძნება (ვერტიგო)
- ლეიკოციტების მკვერო შემცირება, რომელიც ზრდის ინფიცირების რისკს, თრომბოციტების რაოდენობის შემცირება, რომელიც ზრდის სისხლდების ან სისხლცაქცევების განვითარების რისკს
- დავილის დაავადება (გულისრევა, დებინება, მადის დაკარგება, ზოგადი შეუძლოდ ყოფნა, ცხელებითი მდგომარეობა, ქავილი, კანის და სკლერების გაყვითლება, დია ფერის განავალი, მუქი შარდი).

თუ თქვენ გივითარდებათ რომელიმე გვერდითი ეფექტი, მიმართეთ თქვენ მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს. ეს ასევე ეხება ყველა იმ გვერდით ეფექტს, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი ამ ფურცელ-ჩანართში.

#### 5. როგორ ინახება პრედუქტალი® OD 80მგ

პრეპარატი შეინახეთ ბაგშვებისთვის მიუწვდომელ და უხილავ ადგილზე.

არ მიიღოთ პრეპარატი გარგისობის ვადის <> გასვლის შემდეგ, რომელიც მითითებულია მუქაოს და უჯრედულ შეფუთავებების ვარგისობის ვადის მითითებისას იგულისხმება აღნიშნული თვის ბოლო დღე.

ინახება არა უმეტეს 30°C ტემპერატურაზე.

არ შეიძლება წამლის კანალიზაციაში და საყოფაცხოვრებო ნაგავში გადაყრა. პკითხეთ ფარმაცევტს როგორ უნდა მოხდეს წამლების უტილიზაცია, რომელთა მიღებაც დასრულებულია. ეს ზომები მიმართულია გარემოს დაცვისკენ.

#### 6. შეფუთვის შემცველობა და სხვა ინფორმაცია

##### რას შეიცავს პრედუქტალი® OD 80მგ

აქტიური ნივთიერება: ტრიმეტაზიდინი (ტრიმეტაზიდინის დიადროქლორიდის სახით).

პროლონგირებული გამოთვალისუფლების ერთი მქარი კაფსულა შეიცავს 80მგ ტრიმეტაზიდინს.

სხვა კომპონენტები:

კაფსულის შემადგენლობა:

შაქრის სფეროები, რომლებიც შეიცავს საქართვისას და სიმინდის სახამებელს პიპრომედოზა

ეთოლცელულოზა

ტრიბუტილაცეტილციტრაზი

ტალკი

მაგნიუმის სტერატი

კაფსულის გარსი:

შელატინი

ტიტანის დიოქსიდი (E171)

რკინის წითელი ოქსიდი (E172)

მელანი

შელაქი (E904)

ტიტანის დიოქსიდი (E171)

სიმეთიკონი

პროპილენგლიკოლი (E1520)

ამონიუმის ჰიდროქსიდი 28% (E527)

როგორ გამოიყრება პრედუქტალი® OD 80მგ და შეფუთვის შემადგენლობა

პრედუქტიალი® OD 80მგ პროლონგირებული გამოთავისუფლების მყარი კაფსულები წარმოდგენულია თეთრი კორპუსით და ნარინჯისფერ-წითელი თავსახურით, რომელზეც თეთრი ფერის მელნით დაბეჭდილია ფირმის ლოგოტიპი <<სერვიკ>> .

კაფსულები გამოდის კოლოფებში (პოლიამიდი-ალუმინი-პველ და ალუმინის ფოლგის ბლისტერზე) პროლონგირებული გამოთავისუფლების 30 მყარი კაფსულა (10 კაფსულა ბლისტერზე)  
შეიძლება ყველა ზომის კოლოფი არ იყოს გაყიდვაში.

### სარეგისტრაციო მოწმობის მფლობელი და მწარმოებელი:

**სარეგისტრაციო მოწმობის მფლობელი**  
Les Laboratoires Servier/ლე ლაბორატურ სერვიკ  
50, rue Carnot  
92284 Suresnes cedex  
France - საფრანგეთი

**მწარმოებელი**  
Egis Pharmaceutical PLC/ეგის ფარმასიუტიკალს სპკ  
H-1165 Budapest, Bokonyfold ut 118-120  
Hungary (უნგრეთი)

გაცემის რეჟიმი: II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით